胃癌　2023.1

SOX100 療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2･･･15･･･････21
①	グラニセトロン3mgバッグ　100mL 1袋 デキサート3.3mg （3.3mg　1A）	15分かけてDiv	●	休薬
②	5% G　500mL　1本 デキサート3.3mg（3.3mg 1A） ***オキサリプラチン　100mg/㎡***	2時間かけてDiv	●	
③	生食　50mL　1本	フラッシュ用	●	
④	***S-1　40mg/回　1.25㎡未満*** ***50mg/回　1.25㎡以上1.5㎡未満*** ***60mg/回　1.5㎡以上***	14日間連続内服 1日2回朝夕食後に内服		1週休薬

SOX130 療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2･･･15･･･････21
①	グラニセトロン3mgバッグ　100mL 1袋 デキサート3.3mg （3.3mg　1A）	15分かけてDiv	●	休薬
②	5% G　500mL　1本 デキサート3.3mg（3.3mg 1A） ***オキサリプラチン　130mg/㎡***	2時間かけてDiv	●	
③	生食　50mL　1本	フラッシュ用	●	
④	***S-1　40mg/回　1.25㎡未満*** ***50mg/回　1.25㎡以上1.5㎡未満*** ***60mg/回　1.5㎡以上***	14日間連続内服 1日2回朝夕食後に内服		1週休薬

XELOX

	薬剤		投与方法/投与日	1クール21日	
				Day1	2･･14･･･････21
①	グラニセトロン3mgバッグ　100mL 1袋 デキサート　3.3mg （3.3mg　1A）		15分かけてDiv	●	休薬
②	5% G　500mL　1本 デキサート　3.3mg （3.3mg　1A） ***オキサリプラチン　130mg/㎡***		2時間かけてDiv	●	
③	生食　50mL　1本		フラッシュ用	●	
④	***カペシタビン***	*1200mg/回　1.36㎡未満* *1500mg/回　1.36㎡以上1.66㎡未満* *1800mg/回　1.66㎡以上1.96㎡未満* *2100mg/回　1.96㎡以上*	14日間連日内服 （1日2回朝夕食後）	↓ ↓･･･････ ↓ （1日2回14日間 連日内服）	1週休薬

無断転載禁止

サイラムザ・weekly PTX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日			
			Day1	8	15	16･･･28
①	レスタミンコーワ 50mg（10mg 5T）	化学療法前内服	●	●	●	休薬
②	生食 50mL 1本 ファモチジン 20mg 1A デキサート 9.9mg（3.3mg 3A）	15分かけてDiv	●	●	●	
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●	●	●	
④	生食 250mL 1袋 ***サイラムザ 8mg/kg***	初回は60分かけてDiv 2回目以降30分（忍容性良好時）	●		●	
⑤	生食 100mL 1本	1時間かけてDiv （IRなければ3クール目より省略可）	●		●	
⑥	生食 250mL 1袋 ***パクリタキセル 60～80mg/㎡***	1時間かけてDiv	●	●	●	
⑦	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	●	

サイラムザ・weekly nab-PTX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日			
			Day1	8	15	16･･･28
①	レスタミンコーワ 50mg（10mg 5T）	化学療法前内服	●		●	休薬
②	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg（3.3mg 2A）	15分かけてDiv	●	●	●	
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●		●	
④	生食 250mL 1袋 ***サイラムザ 8mg/kg***	初回は60分かけてDiv 2回目以降30分（忍容性良好時）	●		●	
⑤	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●		●	
⑥	生食 100mL 1本	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 1Vに付き20mLで溶解	●	●	●	
	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝの溶解に使用した生食100mLから残りの生食を全部抜き取る。 その後、懸濁したｱﾌﾞﾗｷｻﾝを空の生食容器に泡立てないように入れる。					
	アブラキサン 100mg/㎡	30分かけてDiv	●	●	●	
⑦	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	●	

サイラムザ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール14日	
			Day1	･･･････14
①	レスタミンコーワ 50mg（10mg 5T）	化学療法前内服	●	休薬
②	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●	
③	生食 250mL 1袋 ***サイラムザ 8mg/kg***	初回は60分かけてDiv 2回目以降30分 （忍容性良好時）	●	
④	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	

無断転載禁止

CPT-11

	薬剤	投与方法/投与日	1クール14日	
			Day1	2・・・・・・14
①	グラニセトロン3mgバッグ100mL 1袋 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	休薬
②	5%ブドウ糖 250mL 1本 ***イリノテカン 150mg/㎡***	90分かけてDiv	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	

weeklyPTX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日			
			Day1	8	15	16・・28
①	レスタミンコーワ 50mg (10mg 5T)	化学療法前内服	●	●	●	休薬
②	生食 50mL 1本 ファモチジン 20mg 1A デキサート 9.9mg(3.3mg 3A)	15分かけてDiv	●	●	●	
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●	●	●	
*過敏症予防のために(ﾚｽﾀﾐﾝ・ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ・ﾃﾞｷｻｰﾄ)とﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙは必ず30分以上あける。						
④	生食 250mL 1袋 ***パクリタキセル 80mg/㎡***	1時間かけてDiv	●	●	●	
⑤	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	●	

weekly nab-PTX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日			
			Day1	8	15	16・・28
①	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	●	●	休薬
②	生食 100mL 1本	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 1Vに付き20mLで溶解	●	●	●	
	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝの溶解に使用した生食100mLから残りの生食を全部抜き取る。 その後、懸濁したｱﾌﾞﾗｷｻﾝを空の生食容器に泡立てないように入れる。					
	アブラキサン 100mg/㎡	30分かけてDiv	●	●	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	●	

転載禁止

nab-PTX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2・・・・・21
①	生食　50mL　1本 デキサート　6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	休薬
②	生食　100mL　1本	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ溶解用 1Vに付き20mLで溶解	●	
	ｱﾌﾞﾗｷｻﾝの溶解に使用した生食100mLから残りの生食を全部抜き取る。 その後、懸濁したｱﾌﾞﾗｷｻﾝを空の生食容器に泡立てないように入れる。			
	アブラキサン　260mg/㎡	30分かけてDiv	●	
③	生食　50mL　1本	フラッシュ用	●	

DOC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2・・・・・・・21
①	生食　50mL　1本 デキサート　6.6mg　(3.3mg　2A)	15分かけてDiv	●	休薬
②	生食　250mL　1袋 ***ドセタキセル　60mg/㎡***	1時間かけてDiv	●	
③	生食　50mL　1本	フラッシュ用	●	

S-1・DOC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日		
			Day1	2・・・・・・14・・・21	
①	生食　50mL　1本 デキサート　6.6mg　(3.3mg　2A)	15分かけてDiv	●	休薬	
②	生食　250mL　1袋 ***ドセタキセル　40mg/㎡***	1時間以上かけてDiv	●		
③	生食　50mL　1本	フラッシュ用	●		
④	***S-1　40mg/回　1.25㎡未満*** ***50mg/回　1.25㎡以上1.5㎡未満*** ***60mg/回　1.5㎡以上***	14日間連日内服 (1日2回朝夕食後)	↓↓・・・・・・・・↓ 14日間連続内服		休薬

無断転載禁止

S-1・weekly PTX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日		
			Day1	8	・14・・・21
①	レスタミンコーワ　50mg　(10mg　5T)	化学療法前内服	●	●	休薬
②	生食　50mL　1本 ファモチジン　20mg　1A デキサート 9.9mg　(3.3mg　3A)	15分かけてDiv	●	●	
③	生食　100mL　1本	30分かけてDiv	●	●	
*過敏症予防のために(ﾚｽﾀﾐﾝ・ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ・ﾃﾞｷｻｰﾄ)とﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙは必ず30分以上あける。					
④	生食　250mL　1袋 ***パクリタキセル　50mg/㎡***	1時間かけてDiv	●	●	
⑤	生食　50mL　1本	フラッシュ用	●	●	
⑥	***S-1　40mg/回　1.25㎡未満*** ***50mg/回　1.25㎡以上1.5㎡未満*** ***60mg/回　1.5㎡以上***	14日連日内服 (1日2回朝夕食後)	↓↓・・・・・・・↓ 14日間連続内服		休薬

S-1・CPT-11

	薬剤	投与方法/投与日	1クール35日			
			Day1	・・	15	・21・・・35
①	グラニセトロン3mgバッグ　100mL 1本 デキサート6.6mg　(3.3mg　2A)	15分かけてDiv	●	休薬	●	休薬
②	5%ブドウ糖液　250mL　1本 ***イリノテカン　80mg/㎡***	90分かけてDiv	●		●	
③	生食　50mL　1本	フラッシュ用	●		●	
④	***S-1　40mg/回　1.25㎡未満*** ***50mg/回　1.25㎡以上1.5㎡未満*** ***60mg/回　1.5㎡以上***	21日間連続内服 (1日2回朝夕食後)	↓↓↓・・　・・　↓↓↓ 21日間連続内服			休薬

HER・SOX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2・・・15・・・・・・・21
①	グラニセトロン3mgバッグ　100mL 1袋 デキサート3.3mg　(3.3mg　1A)	15分かけてDiv	●	休薬
②	生食　250mL　1本 注射用水　100mL　1本　(溶解用) ***トラスツズマブ*** ***初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg***	初回は90分でDiv 忍容性が良好であれば 2回目以降30分	●	
③	生食　20mL　1本	フラッシュ用	●	
④	5% G　500mL　1本 デキサート3.3mg (3.3mg 1A) ***オキサリプラチン　130mg/㎡***	2時間かけてDiv	●	
⑤	生食　50mL　1本	フラッシュ用	●	
⑥	***S-1　40mg/回　1.25㎡未満*** ***50mg/回　1.25㎡以上1.5㎡未満*** ***60mg/回　1.5㎡以上***	14日間連続内服 1日2回朝夕食後に内服		1週休薬

無断転載禁止

HER・XELOX

	薬剤		投与方法/投与日	1クール21日		
				Day1	2・・14・・・・・・21	
①	グラニセトロン3mgバッグ　100mL 1袋 デキサート 3.3mg （3.3mg 1A）		15分かけてDiv	●	休薬	
②	生食 250mL 1本 注射用水 100mL 1本 （溶解用） ***トラスツズマブ　初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg***		初回は90分でDiv 忍容性が良好であれば 2回目以降30分	●		
③	生食 20mL 1本		フラッシュ用	●		
④	5% G 500mL 1本 デキサート 3.3mg （3.3mg 1A） ***オキサリプラチン　130mg/㎡***		2時間かけてDiv	●		
⑤	生食 50mL 1本		フラッシュ用	●		
⑥	***カペシタビン***	*1200mg/回　1.36㎡未満 1500mg/回　1.36㎡以上1.66㎡未満 1800mg/回　1.66㎡以上1.96㎡未満 2100mg/回　1.96㎡以上*	14日間連日内服 （1日2回朝夕食後）	↓ ↓・・・・・・・↓ （1日2回14日間連日内服）		1週休薬

【2 週】オプジーボ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール14日	
			Day1	2・・・・・・・14
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 ***オプジーボ　240mg/body***	側管から30分でDiv	●	

【4 週】オプジーボ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日	
			Day1	2・・・・・・・28
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 ***オプジーボ　480mg/body***	側管から30分でDiv	●	

無断転載禁止

エンハーツ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2・・・・・・・・21
①	パロノセトロンバッグ　0.75mg　50mL　1袋 デキサート　6.6mg　（3.3mg 2A）	15分かけてDiv	●	休薬
②	5%ブドウ糖液　50mL　1本	フラッシュ用	●	
③	5%　Tz　100mL　1本 注射用水　20mL(溶解用1V：5mL） ***エンハーツ　6.4mg/kg***	初回は90分Div 2回目以降30分Div （忍容性良好時）	●	
④	5%ブドウ糖液　50mL　1本	フラッシュ用	●	

オプジーボ・XELOX

	薬剤		投与方法/投与日	1クール21日		
				Day1	2・・14・・・・・・21	
①	生食　50mL　1本		5分かけてDiv	●	休薬	
②	生食　100mL　1本 オプジーボ　360mg/body		30分かけてDiv	●		
③	生食　50mL　1本		5分かけてDiv	●		
④	グラニセトロン3mgバッグ　100mL 1袋 デキサート　3.3mg　（3.3mg　1A）		15分かけてDiv	●		
⑤	5%　G　500mL　1本 デキサート　3.3mg　（3.3mg　1A） ***オキサリプラチン　130mg/㎡***		2時間かけてDiv	●		
⑥	生食　50mL　1本		フラッシュ用	●		
⑦	***カペシタビン***	*1200mg/回　1.36㎡未満* *1500mg/回　1.36㎡以上1.66㎡未満* *1800mg/回　1.66㎡以上1.96㎡未満* *2100mg/回　1.96㎡以上*	14日間連日内服 （1日2回朝夕食後）	↓↓・・・・・・・↓ （1日2回14日間連日内服）		1週休薬

無断転載禁止

オプジーボ・SOX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2･･･15･･･････21
①	生食　50mL　1本	5分かけてDiv	●	休薬
②	生食　100mL　1本 オプジーボ　360mg/body	30分かけてDiv	●	
③	生食　50mL　1本	5分かけてDiv	●	
④	グラニセトロン3mgバッグ　100mL 1袋 デキサート3.3mg　(3.3mg　1A)	15分かけてDiv	●	
⑤	5% G　500mL　1本 デキサート3.3mg (3.3mg 1A) ***オキサリプラチン　130mg/㎡***	2時間かけてDiv	●	
⑥	生食　50mL　1本	フラッシュ用	●	
⑦	***S-1　40mg/回　1.25㎡未満*** ***50mg/回　1.25㎡以上1.5㎡未満*** ***60mg/回　1.5㎡以上***	14日間連続内服 1日2回朝夕食後に内服		1週休薬

無断転載禁止