

食道癌 2023.5

DOC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	休業
②	生食 250mL 1袋 ドセタキセル 70mg/m ²	1時間かけてDiv	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	

weekly PTX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日				
			Day1	8	15	16..28	
①	レスタミンコーワ 50mg (10mg 5T)	化学療法前内服	●	●	●	休業	
②	生食 50mL 1本 ファモチジン 20mg 1A デキサート 9.9mg(3.3mg 3A)	15分かけてDiv	●	●	●		
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●	●	●		
*過敏症予防のために(レスタミン・ファモチジン・デキサート)とパクリタキセルは必ず30分以上あける。							
④	生食 250mL 1袋 パクリタキセル 100mg/m ²	1時間かけてDiv	●	●	●		
⑤	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	●		

【2週】オブジーボ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール14日	
			Day1	2.....14
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休業
②	生食 100mL 1本 オブジーボ 240mg/body	側管から30分でDiv	●	

【4週】オブジーボ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日	
			Day1	2.....28
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 オブジーボ 480mg/body	側管から30分でDiv	●	

キイトルーダ・CDDP・5-FU

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日						
			Day1	2	3	4	5	6	..21
①	生食 50mL 1本	メインルート 5分かけてDiv	●						休薬
②	生食 100mL 1本 キイトルーダ 200mg/body	メインルート 30分かけてDiv	●						
③	生食 500mL 1本	メインルート 1時間かけてDiv	●						
④	パロノセトロン 0.75mg/バッグ 50mL 1袋 デキサート 9.9mg (3.3mg 3A)	メインルート 15分かけてDiv	●						
⑤	ソリタT1 500mL 1本 硫酸Mg補正液 0.4A (8mEq)	メインルート 1時間かけてDiv	●						
⑥	生食 300mL (500mL 0.6本) シスプラチン 80mg/m ²	メインルート 2時間かけてDiv	●						
⑦	ソリタT3 500mL 1本 フルオロウラシル 800mg/m ²	メインルート 24時間かけてDiv	●	●	●	●	●		
* ⑧以下はメインルート⑦の側管から									
⑧	生食 100mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	側管から 15分かけてDiv		●	●	●	●		
⑨	ソリューゲンF 500mL 1本 フロセミド 10mg (20mg 1/2A)	側管から 2時間かけてDiv	●						
⑩	ソリタT1 500mL 1本 硫酸Mg補正液 0.4A (8mEq) KCL注 0.5本 (10mEq)	側管から 2時間かけてDiv	●						
⑪	ソリタT3 500mL 1本	側管から 90分かけてDiv		●	●	●	●		
⑫	ソリタT3 500mL 1本	側管から 90分かけてDiv		●	●	●	●		
⑬	生食 50mL 1本	フラッシュ用						●	

(維持)キイトルーダ・5-FU

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日						
			Day1	2	3	4	5	6	…21
①	生食 50mL 1本	5分かけてDiv	●						休薬
②	生食 100mL 1本 キイトルーダ 200mg/body	30分かけてDiv	●						
③	生食 50mL 1本	5分かけてDiv	●						
④	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv 2日目以降5-FU側管 から	●	●	●	●	●		
⑤	ソリタ3 500mL 1本 フルオロウラシル 800mg/m ²	24時間かけてDiv	●	●	●	●	●		
⑥	生食 50mL 1本	フラッシュ用						●	

【3週】キイトルーダ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2………21
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 キイトルーダ 200mg/body	側管から30分でDiv	●	

【6週】キイトルーダ療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール42日	
			Day1	2………42
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 キイトルーダ 400mg/body	側管から30分でDiv	●	

オブジーボ・ヤーボイ療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール42日			
			Day1	...	22	...42
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●		●	
②	生食 100mL 1本 オブジーボ 360mg/body	側管から30分でDiv	●		●	
③	生食 100mL 1本	側管から30分でDiv	●			
④	生食 50mL 1本(30mL抜く) ヤーボイ 1mg/kg	側管から30分でDiv	●			