

膵臓癌 2022.6

nab-PTX・GEM

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日			
			Day1	8	15	16・・・28
①	グラニセトロン3mgバッグ 100mL 1袋 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	●	●	休薬
②	生食 100mL 1本	アブラキサン溶解用 1Vにつき20mLで溶解	●	●	●	
	アブラキサンの溶解液に使用した生食100mLから残りの生食を全部抜き取る。 その後、懸濁したアブラキサンを空の生食容器に泡立てないように入れる。					
	アブラキサン 125mg/m ²	30分かけてDiv	●	●	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ	●	●	●	
④	5%ブドウ糖液 100mL 1本 ゲムシタピン 1000mg/m ²	30分かけてDiv	●	●	●	
⑤	生食 50mL 1本	フラッシュ	●	●	●	

GEM

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日			
			Day1	8	15	16・・・28
①	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	●	●	休薬
②	5%ブドウ糖液 100mL 1本 ゲムシタピン 1000mg/m ²	30分かけてDiv	●	●	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	●	

GEM・S-1

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日		
			Day1	8	9・14・・・21
①	グラニセロン3mgバッグ 100mL 1袋 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	●	休薬
②	5%ブドウ糖液 100mL 1本 ゲムシタピン 1000mg/m ²	30分かけてDiv	●	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	
④	S-1 40mg/回 1.25m ² 未満 50mg/回 1.25m ² 以上1.5m ² 未満 60mg/回 1.5m ² 以上	14日間連日内服 (1日2回朝夕食後)	↓↓……………↓ (14日間連日内服)		1週 休薬

GEM・タルセバ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日			
			Day1	8	15	16・・・28
①	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	●	●	休薬
②	5%ブドウ糖液 100mL 1本 ゲムシタピン 1000mg/m ²	30分かけてDiv	●	●	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	●	
④	タルセバ錠 1日1回 100mg	食間 連日内服	→	→		

(ポンプ用)オニバイド・5-FU・I-LV

	薬剤	投与方法/投与日	1クール 14日
			day1
①	グラニセトロンバッグ [®] 100mL 1袋 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけて	●
②	5%G 500mL 1本 オニバイド 70mg/m ²	90分かけて	●
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●
④	5%G 250mL 1本 レボホリナート 200mg/m ²	2時間かけて	●
⑤	5%G 250mL 1本 全量 230mL とする フルオロウラシル 2400mg/m ²	46時間かけて	●