

肝臓癌 2023.7

テセントリク・アバスチン

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール21日 | |
|---|-----------------------------------|---|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....21 |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休薬 |
| ② | 生食 250mL 1袋 テセントリク 1200mg/body | 側管から60分でDiv 2回目以降 30分 (忍容性良好時) | ● | |
| ③ | 生食 50mL 1本 | 側管から5分でDiv フラッシュ用 | ● | |
| ④ | 生食 100mL 1袋 アバスチン 15mg/kg | 側管から90分かけてDiv 2回目以降 60分 (忍容性良好時) 3回目以降 30分 (忍容性良好時) | ● | |

サイラムザ

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール14日 | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| | | | Day1 |14 |
| ① | レスタミンコーワ 50mg (10mg 5T) | 化学療法前内服 | ● | 休薬 |
| ② | 生食 100mL 1本 | 30分かけてDiv | ● | |
| ③ | 生食 250mL 1袋 サイラムザ 8mg/kg | 初回は60分かけてDiv 2回目以降30分 (忍容性良好時) | ● | |
| ④ | 生食 50mL 1本 | フラッシュ用 | ● | |

イミフィンジ・イジユド療法

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール28日 | |
|---|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....28 |
| | | | | 休薬 |
| ① | 生食 50mL 1本 | 10分かけてDiv | ● | |
| ② | 生食 100mL 1本 イジユド 300mg/body | 60分かけてDiv | ● | |
| ③ | 生食 50mL 1本 | 10分かけてDiv | ● | |
| ④ | 生食 100mL 1本 イミフィンジ 1500mg/body | 60分かけてDiv | ● | |
| ⑤ | 生食 50mL 1本 | フラッシュ用 | ● | |

イミフィンジ療法

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール28日 | |
|---|-----------------------------------|-----------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....28 |
| | | | | 休薬 |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | |
| ② | 生食 100mL 1本 イミフィンジ 1500mg/body | 60分かけてDiv | ● | |