

子宮体癌 2024.7

TC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	レスタミン錠 50mg (10mg 5T)	化学療法前内服	●	休薬
②	グラニセトロン3mgハック 100mL 1袋 ファモチジン 20mg 1A デキサート 16.5mg (3.3mg 5A)	15分かけてDiv	●	
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●	
* 過敏症予防のために(レスタミン、ファモチジン、デキサート)とパクリタキセルは必ず30分以上あける。				
④	生食 500mL 1本 パクリタキセル 175mg/m ²	3時間かけてDiv	●	
⑤	生食 250mL 1袋 カルボプラチン Calvert式 AUC6	1時間かけてDiv	●	
⑥	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	

DC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	グラニセトロン3mgハック 100mL 1袋 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	休薬
②	生食 250mL 1袋 ドセタキセル 70mg/m ²	1時間かけてDiv	●	
③	生食 250mL 1袋 カルボプラチン Calvert式 AUC5	1時間かけてDiv	●	
④	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	

GEM・DOC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日		
			Day1	8	9.....21
①	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●		休薬
②	グラニセトロン3mg ^{ハグ} 100mL 1袋 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv		●	
③	5%ブドウ糖液 100mL 1本 ゲムシタピン 900mg/m²	30分かけてDiv	●	●	
④	生食 250mL 1袋 ドセタキセル 70mg/m²	1時間かけてDiv		●	
⑤	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	

DOC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	休薬
②	生食 250mL 1袋 ドセタキセル 70mg/m²	1時間かけてDiv	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	

ハラヴェン

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日		
			Day1	8	9.....21
①	生食 250mL 1本	ルート確保 ハラヴェン終了後1時間で Div	●	●	休薬
②	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	側管から 15分かけてDiv	●	●	
③	生食 50mL 1本 ハラヴェン 1.4mg/m²	側管から全開でDiv	●	●	

【3週】・キイトルーダ・レンビマ療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 キイトルーダ 200mg/body	側管から30分でDiv	●	
③	レンビマカプセル 20mg/日	1日1回 連日内服	↓↓↓...↓↓↓	

ドキシソルビシン療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	生食 250mL 1袋	ルートキープ用 Rp③終了後30分かけてDiv	●	休薬
②	パロノセトロンバッグ 50mL 1袋 デキサート 9.9mg (3.3mg 3A)	側管から15分かけてDiv	●	
③	生食 50mL 1袋 ドキシソルビシン 75mg/m ²	側管から全開	●	