

子宮頸癌 2023.7

TC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	レスタミン錠 50mg (10mg 5T)	化学療法前内服	●	休薬
②	グラニセトロン3mgバッグ 100mL 1袋 ファモチジン 20mg 1A デキサート 16.5mg (3.3mg 5A)	15分かけてDiv	●	
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●	
* 過敏症予防のために(レスタミン、ファモチジン、デキサート)とパクリタキセルは必ず30分以上あける。				
④	生食 500mL 1本 パクリタキセル 175mg/m ²	3時間かけてDiv	●	
⑤	生食 250mL 1袋 カルボプラチン Calvert式 AUC5	1時間かけてDiv	●	
⑥	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	

(ア)TC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	レスタミン錠 50mg (10mg 5T)	化学療法前内服	●	休薬
②	パロノセトロンバッグ 0.75mg 50mL 1袋 ファモチジン 20mg 1A デキサート 16.5mg (3.3mg 5A)	15分かけてDiv	●	
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●	
* 過敏症予防のために(レスタミン、ファモチジン、デキサート)とパクリタキセルは必ず30分以上あける。				
④	生食 500mL 1本 パクリタキセル 175mg/m ²	3時間かけてDiv	●	
⑤	生食 250mL 1袋 カルボプラチン Calvert式 AUC5	1時間かけてDiv	●	
⑥	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	

CPT-11・NDP

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日		
			Day1	8	9.....28
①	グラニセロン3mgバッグ 100mL 1袋 デキサート 6.6mg(3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	●	休薬
②	生食 500mL 1本 イリノテカン 60mg/m ²	90分かけてDiv	●	●	
③	生食 500mL 1本 アクプラ 80mg/m ²	2時間かけてDiv	●		
④	ヴィーンD 500mL 1本	1時間かけてDiv	●		
⑤	ソリタT3 500mL 1本	1時間かけてDiv	●		
⑥	生食 50mL 1本	フラッシュ用		●	

アバスチン・TC

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日		
			Day1	2.....21	
①	レスタミンコーワ 50mg (10mg 5T)	化学療法前内服	●	休薬	
②	グラニセロン3mgバッグ 100mL 1袋 ファモチジン 20mg 1A デキサート 16.5mg (3.3mg 5A)	15分かけてDiv	●		
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●		
*過敏症予防のために(レスタミン・ファモチジン・デキサート)とパクリタキセルは必ず30分以上あける。					
④	生食 500mL 1本 パクリタキセル 175mg/m ²	3時間かけてDiv	●		
⑤	生食 250mL 1袋 カルボプラチン Calvert式 AUC 5	1時間かけてDiv	●		
⑥	生食 20mL 1A	フラッシュ	●		
⑦	生食 100mL 1本 アバスチン 15mg/kg	初回は90分かけてDiv 2回目は60分(忍容性良好時) 3回目以降は30分(同上)	●		
⑧	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●		

アバステン

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 アバステン 15mg/kg	側管から30分でDiv	●	

CPT-11

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日			
			Day1	8	15	16.....28
①	グラニセトン3mgバッグ100mL 1袋 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	●	●	休薬
②	5%ブドウ糖 250mL 1本 イリノテカン 100mg/m ²	90分かけてDiv	●	●	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	●	

Radi 併用 CDDP

	薬剤	投与方法/投与日	1クール7日	
			Day1	2.....7
①	パロノセトンバッグ 50mL 1袋 デキサート 9.9mg(3.3mg 3A)	15分かけてDiv	●	休薬
②	ソリタT3 500mL 1本	1時間かけてDiv	●	
③	ソリタT3 500mL 1本 KCL注キット 10mL 硫酸Mg補正液 8mL	1時間かけてDiv	●	
④	生食 500mL 1本 シスプラチン 40mg/m ²	1時間かけてDiv	●	
⑤	マンニトールS 300mL 1本	30分かけてDiv	●	
⑥	ソリタT3 500mL 1本 KCL注キット 10mL	1時間かけてDiv	●	

Radi 併用 TP

	薬剤	投与方法/投与日	1クール7日	
			Day1	2.....7
①	レスタミンコーワ 50mg (10mg 5T)	化学療法前内服	●	休薬
②	グラニセトロン3mgバッグ100mL 1袋 ファモチジン20mg 1A デキサート 9.9mg (3.3mg 3A)	15分かけてDiv	●	
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●	
*過敏症予防のために(レスタミン・ファモチジン・デキサート)とパクリタキセルは必ず30分以上あける。				
④	生食 250mL 1袋 パクリタキセル 50mg/m ²	1時間かけてDiv	●	
⑤	生食 500mL 1本 シスプラチン 30mg/m ²	1時間かけてDiv	●	
⑥	ソリタT3 500ml 1本	1時間かけてDiv	●	
⑦	ソリタT3 500ml 1本	1時間かけてDiv	●	

リブタヨ療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 リブタヨ 350mg/body	側管から30分でDiv	●	