

腎臓癌 2023.1

オブジーボ・ヤーボイ

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール21日 | |
|---|-----------------------------------|-------------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....21 |
| | | | | |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休業 |
| ② | 生食 100mL 1本 オブジーボ 240mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |
| ③ | 生食 100mL 1本 | 側管から30分でDiv | ● | |
| ④ | 生食 50mL 1本(30mL抜く) ヤーボイ 1mg/kg | 側管から30分でDiv | ● | |

【2週】オブジーボ

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール14日 | |
|---|---------------------------------|-------------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....14 |
| | | | | |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休業 |
| ② | 生食 100mL 1本 オブジーボ 240mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |

【4週】・オブジーボ

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール28日 | |
|---|---------------------------------|-------------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....28 |
| | | | | |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休業 |
| ② | 生食 100mL 1本 オブジーボ 480mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |

トリーセル

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール7日 | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| | | | Day1 |7 |
| ① | 生食 50mL 1本 ポララミン 5mg 1A | 15分かけてDiv | ● | 休薬 |
| ② | 生食 100mL 1本 | 30分かけてDiv | ● | |
| * 過敏症予防のためにポララミンとトリーセルは必ず30分以上あける。 | | | | |
| ③ | 生食 250mL 1袋 トリーセル 25mg/body | 1時間かけてDiv | ● | |
| ④ | 生食 50mL 1本 | フラッシュ用 | ● | |

キイトルーダ・インライタ

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール21日 | |
|---|----------------------------------|-------------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....21 |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休薬 |
| ② | 生食 100mL 1本 キイトルーダ 200mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |
| ③ | インライタ錠 5mg/回 | 1日2回 連日内服 | ↑↑ | |

オブジーボ・カボメティクス

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール14日 | |
|---|---------------------------------|-------------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....14 |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休薬 |
| ② | 生食 100mL 1本 オブジーボ 240mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |
| ③ | カボメティクス錠 40mg/回 | 1日1回空腹時 | ↑ | |

【4週】オブジーボ・カボメティクス

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール28日 | |
|---|---------------------------------|-------------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....28 |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休薬 |
| ② | 生食 100mL 1本 オブジーボ 480mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |
| ③ | カボメティクス錠 40mg/回 | 1日1回空腹時 | ↑ | ↑↑↑...↑ |

【3週】・キイトルーダ・レンビマ療法

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール21日 | |
|---|----------------------------------|-------------|-----------|----------|
| | | | Day1 | 2.....21 |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休薬 |
| ② | 生食 100mL 1本 キイトルーダ 200mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |
| ③ | レンビマカプセル 20mg/日 | 1日1回 連日内服 | ↓↓↓...↓↓↓ | |

【6週】・キイトルーダ・レンビマ療法

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール42日 | |
|---|----------------------------------|-------------|-----------|----------|
| | | | Day1 | 2.....42 |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休薬 |
| ② | 生食 100mL 1本 キイトルーダ 400mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |
| ③ | レンビマカプセル 20mg/日 | 1日1回 連日内服 | ↓↓↓...↓↓↓ | |

【3週】・キイトルーダ療法

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール21日 | |
|---|----------------------------------|-------------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....21 |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休薬 |
| ② | 生食 100mL 1本 キイトルーダ 200mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |

【6週】・キイトルーダ療法

| | 薬剤 | 投与方法/投与日 | 1クール42日 | |
|---|----------------------------------|-------------|---------|----------|
| | | | Day1 | 2.....42 |
| ① | 生食 100mL 1本 | ルート確保 | ● | 休薬 |
| ② | 生食 100mL 1本 キイトルーダ 400mg/body | 側管から30分でDiv | ● | |