

頭頸部癌 2022.6

オブジーボ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール14日	
			Day1	2.....14
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 オブジーボ 240mg/body	側管から30分でDiv	●	

キイトルーダ

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 キイトルーダ 200mg/body	側管から30分でDiv	●	

アービタックス

	薬剤	投与方法/投与日	1クール7日	
			Day17
①	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg (3.3mg 2A) ポララミン 5mg 1A	15分かけてDiv	●	休薬
②	生食 20mL 1A	フラッシュ	●	
③	生食 250mL 1本 アービタックス 初回 400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ²	<u>生食はアービタックスの投与量 分を抜き取り使用</u> 初回は120分でDiv 2回目以降は60分でDiv	●	
④	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	

* アービタックス投与終了後は、1時間経過観察

アービタックス・weekly PTX

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日					
			Day1	8	15	22	・・・28	
①	レスタミン錠 50mg (10mg 5T)	化学療法前内服	●	●	●	●	休業	
②	生食 50ml 1本 ファモチジン 20mg 1A デキサート 9.9mg (3.3mg 3A)	15分かけてDiv	●	●	●	●		
③	生食 100mL 1本	30分かけてDiv	●	●	●	●		
* 過敏症予防のために(レスタミン、ファモチジン、デキサート)とパクリタキセルは必ず30分以上あける。								
④	生食 250mL 1袋 パクリタキセル 80mg/m ²	1時間かけてDiv	●	●	●	●		
⑤	生食 250mL 1袋	1時間かけてDiv	●	●	●	●		
⑥	生食 250mL 1本 アービタックス 初回 400mg/m ² 2回目以降 250mg/m ²	<u>生食はアービタックスの投与量分を抜き取り使用</u> 初回は120分でDiv 2回目以降は60分でDiv	●	●	●	●		
⑦	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	●	●	●		