

# 脳腫瘍 2021.3

## 【内服】アバスチン・テモダール

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日								
			Day1	2	3	4	5	..	15	16..28	
①	ナゼアOD錠 1回1錠	1日1回寝る前 内服	●	●	●	●	●				休薬
②	テモダールカプセル 150-200mg/m <sup>2</sup>	1日1回寝る前 内服	●	●	●	●	●				
③	生食 100mL 1本	ケモ終了までキープ	●						●		
④	生食 100mL 1本 アバスチン 10mg/kg	初回は90分かけて側管からDiv 2回目は60分(忍容性良好時) 3回目以降30分(同上)	●						●		

## 【注射】アバスチン・テモダール

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日								
			Day1	2	3	4	5	..	15	16..28	
①	グラニセトロン3mgバッグ 100mL 1袋	15分かけてDiv	●	●	●	●	●				休薬
②	生食 20mL 1本	フラッシュ	●	●	●	●	●				
③	生食 250mL 1本 注射用水(※) テモダール注 150-200mg/m <sup>2</sup> (※)テモダール注1Vにつき注射用水41mLで溶解する(2.5mg/mLとなる)	90分かけてDiv	●	●	●	●	●				
④	生食 20mL 1本	フラッシュ	●								
⑤	生食 100mL 1本	ケモ終了までキープ							●		
⑥	生食 100mL 1本 アバスチン 10mg/kg	初回は90分かけてDiv 2回目は60分(忍容性良好時) 3回目以降30分(同上)	●						●		
⑦	生食 50mL 1本	フラッシュ	●	●	●	●	●				

## 【2週毎】アバスチン

	薬剤	投与方法/投与日	1クール14日		
			Day1	2.....14	
①	生食 100mL 1本	ケモ終了までキープ	●		休薬
②	生食 100mL 1本 アバスチン 10mg/kg	側管から 初回は90分かけてDiv 2回目は60分(忍容性良好時) 3回目以降30分(同上)	●		

### 【3週毎】アバスチン

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	生食 100mL 1本	ケモ終了までキープ	●	休薬
②	生食 100mL 1本 アバスチン 15mg/kg	側管から 初回は90分かけてDiv 2回目は60分(忍容性良好時) 3回目以降30分(同上)	●	

無断転載禁止