

悪性中皮腫 2024.7

オブジーボ・ヤーボイ療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール42日			
			Day1	...	22	...42
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●		●	
②	生食 100mL 1本 オブジーボ 360mg/body	側管から30分でDiv	●		●	
③	生食 100mL 1本	側管から30分でDiv	●			
④	生食 50mL 1本(30mL抜く) ヤーボイ 1mg/kg	側管から30分でDiv	●			

【2 週】オブジーボ療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール14日	
			Day1	2.....14
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 オブジーボ 240mg/body	側管から30分でDiv	●	

【4 週】オブジーボ療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール28日	
			Day1	2.....28
①	生食 100mL 1本	ルート確保	●	休薬
②	生食 100mL 1本 オブジーボ 480mg/body	側管から30分でDiv	●	

(S)CDDP・PEM 療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日	
			Day1	2……21
				休薬
①	パロノセトロン 0.75mg/バッグ 50mL 1袋 デキサート 9.9mg(3.3mg 3A) アロカリス点滴静注 235mg 1V	30分かけてDiv	●	
②	生食 100mL 1本(全量100mLとする) ペメトレキセド 500mg/m ²	10分かけてDiv	●	
③	ソリタT1 500mL 1本 KCL注20mEqキット 10mL (0.5本) 硫酸マグネシウム補正液20mEq 8mL(0.4A)	1時間かけてDiv	●	
④	マンニトールS注射液 300mL 1本	30分かけてDiv	●	
⑤	生食 250mL 1袋 シスプラチン 75mg/m ²	1時間かけてDiv	●	
⑥	ソリタT1 500mL 1本 KCL注20mEqキット 10mL (0.5本)	1時間かけてDiv	●	

CDDP・PEM 療法

	薬剤	投与方法/投与日	1クール21日			
			Day1	2	3	4……21
①	ソリタT3 500mL 1本	2時間かけてDiv	●	●	●	休薬
②	生食 100mL 1本 デキサート 6.6mg(3.3mg 2A)	15分かけてDiv		●	●	
③	ヴィーンD 500mL 1本	2時間かけてDiv	●	●	●	
④	パロノセトロン 0.75mg/バッグ 50mL 1袋 デキサート 9.9mg(3.3mg 3A) アロカリス点滴静注 235mg 1V	30分かけてDiv	●			
⑤	生食 100mL 1本(全量100mLとする) ペメトレキセド 500mg/m ²	10分かけてDiv	●			
⑥	生食 250mL 1袋 シスプラチン 75mg/m ²	2時間かけてDiv	●			
⑦	ソリューゲンF 500mL 1本 フロセミド 20mg 1A	2時間かけてDiv	●			
⑧	ヴィーンD 500mL 1本	2時間かけてDiv	●			
⑨	ソリューゲンF 500mL 1本	2時間かけてDiv	●	●	●	

PEM 療法

	薬剤	投与方法	1クール21日	
			Day1	2.....21
①	生食 50mL 1本 デキサート 6.6mg(3.3mg 2A)	15分かけてDiv	●	休薬
②	生食 100mL 1本(全量100mLとする) ペメトレキセド 500mg/m ²	10分かけて	●	
③	生食 50mL 1本	フラッシュ用	●	